

第5章

はんざい 麻薬犯罪の現状と取組み

皆さんも麻薬の恐ろしさについてはお聞きになったことがあると思います。この章ではいろいろな麻薬について、その特徴や使い始めたきっかけ、注意すべきことなどを紹介します。

1 麻薬の種類

かくせいざい
覚醒剤

原料 まおう 麻黄（植物）や石油です。

かくせいざい
覚醒剤が体などに与える影響

① とても気持ちが高ぶります。



- ② 一度にたくさん飲んだりすると、急に気持ちがおかしく変になったり、体が思うように動かなくなったりします。
- ③ 覚醒剤^{かくせいざい}の効き目がなくなると、とても疲れ^{つか}れたり、力が抜け^ぬたり、気持ちが悪くなったりします。
- ④ 1回試すと、すぐまた覚醒剤^{かくせいざい}が欲^ほしくなり、また、量もだんだん多くなってきました。このようなことが繰り返し行われると、覚醒剤^{かくせいざい}がなくてはならないようになります（「依存症^{いぞんしょう}」といいます）。



かくせいざい
(覚醒剤)

ぞくしやう

俗称(ほかの呼び名)

アイス シャフ スピード(エス) クリスタル ガンコロ
ユキネタ アカネタ

かくせいざい

覚醒剤の効き目がなくなった場合

- ① 繰り返し覚せい剤を使っていると覚醒剤依
存症になります。
- ② 覚醒剤を長い間使っていると、体や精神に
異常^{いじよう}を起こし、普通の生活が出来なくなりま
す。
- ③ 覚醒剤を使い続けると、食べ物が食べられな
くなったり、精神病^{せいしんびよう}になったり、死んでしまう
こともあります。

大 麻

原料 大麻草です。葉や花を乾燥^{かんそう}させたもの、樹液^{じゅえき}
を固めたものや液体^{えきたい}になったものがあります。

大麻の体に与える影響

- ① 体や気持ちに異常な変化を起こし、普通の生
活が出来なくなったりします。



- ② 一時、急に気持ちに変化を起こし、感覚が普通ではなくなります。
- ③ 一時に、多くの量を吸ったりすると、大麻の毒素によって、急に神経などの働きが冒されて、普通のようにはいられなくなります。
- ④ 長い間続けて吸ったりしていると、体に異常を起こし、さらに、意識変化などの精神病症状が現れてきます。



左 大麻草

下 大麻樹脂



俗称(ほかの呼び方)

ハッシェ ハッシュ グラス ハッパ ジョイント
タイスティック

あへん・モルヒネ・ヘロイン

原料 あへん・モルヒネ・ヘロインの原料はそれぞれケシ（植物）からつくられます。体に与える影響の強い弱いはありますが、作り方の違い^{ちが}によるもので、呼び方も違います。

あへんなどの体に与える影響

- ① 少量だと痛みを和^{やわ}らげます。ガンの痛みを和らげる力があります。
- ② 多く吸ったり、注射をしたりしますとあへんなどの毒が体に悪い影響を与えて、息苦しく^{いきぐる}なったり何も分からない意識不明^{ふめい}のままになったりします。
- ③ 繰り返し使って（吸ったり、注射したりして）いると、無くてはいられなくなり、注射をやめたりすると、非常に激^{はげ}しい苦^{くる}しみがあらわれ、七転八倒^{しちてんぱつとう}するようになります。



上から
あへん
ヘロイン



俗称(ほかの呼び方)
スマック ジャンク ヘロ ペーチャイナホワイト

コカイン

原料 コカの葉です。コカ葉からしぼりだしたコカペーストから余分なものを取り除いたものがコカインです。

コカインの体を与える影響

- ① 覚醒剤と同じようになります。
- ② コカインの効き目がなくなると落ち込んだようになります
- ③ 使い続けると精神病のようになります。
- ④ コカインは手足や体の一部をしびれさせる働きがあります。

(コカイン)



俗称(ほかの呼び方)
コーク スノウ ノース
ス クラック フレイク




L S D

原料 ライ麦に^{きせい}寄生する^{ばくかくきん}麥角菌から作られます。

LSD の体に与える影響

- ① 強い^{げんかくさよう}幻覚作用があります。
- ② 物を見ることの出来るところ（^{しかく}視覚）に大きな変化が起こり、普通の生活が出来なくなったりします。
- ③ 陽気になったり、^{ぎやく}逆に、^{よく}抑うつになったりします。
- ④ 精神病のようになり、自殺するようなことが^お起きます。

(LSD)



MDMA

原料 化学薬品から作られます。覚せい剤と同じようなものです。

MDMA が体を与える影響

- ① 覚せい剤と同じようになります。
- ② 見ること、聞くことに変化がおきます。
- ③ 陽気になりますが、心配をしたり、眠れなくなる
ことがあります。
- ④ 長く使い続けると肝臓や腎臓の働きをだめに
して、物覚えが悪くなります。
- ⑤ 暴れだしたりすることがあります。

(MDMA)



俗称(ほかの呼び方)
エクスタシー
ラフドラッグ
バッ

MDA



~~~~~  
その他の麻薬類として「マジックマッシュルーム」  
というものがあります。これは麻薬を含んだきのこ  
です。

「<sup>こうせいしんやく</sup>向精神薬」といわれるものがあります。

これは医者<sup>おこ</sup>の指導を受けて使わないと、自分では  
やめられなくなる薬です。長く使い続けると、怒り  
やすくなったり、気持ちが落ち着かなくなったりし  
ます。薬をやめると、見たり聞いたりする器官に大  
きな変化を起こし、普通の生活が出来なくなります。

### (向精神薬)




### 第三次覚醒剤乱用期

昭和29年（1954年）、小学校4年生の少女が学校内で覚醒剤乱用者に殺されるという事件が発生しました。その頃が第一次覚醒剤乱用期です（下のグラフ参照）。罰則や取締りを強めて犯罪は少なくなりました。昭和45年頃から暴力団が新たな収入源を求めて密売を開始して全国に波及しました（第二次乱用期）。

そして、平成6年頃からは10代、20代の青少年の検挙者が増加してきたのが特徴です（第三次乱用期）。

**覚醒剤取締法違反者は なかなか少なくならない**

3-3-1-1図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移



注 1 内閣府の資料による。ただし、平成19年までは、厚生労働省医薬食品局、警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資料による。  
2 覚せい剤に係る麻薬特例法違反の検挙人員を含む。



(平成 21 年犯罪白書による)

## 2 麻薬<sup>はんざい</sup>犯罪と取組み

### 麻薬事件<sup>けんきょしや</sup>での検挙<sup>じょうきやう</sup>者の状況

それではまず麻薬事件でどれくらいの人が検挙されているのでしょうか。政府の「薬物乱用防止新 5 年戦略<sup>せんりやく</sup>フォローアップ」資料から紹介します。

#### 覚醒<sup>かくせいざいじはん</sup>剤事犯(事件)検挙人員(人)

| 平成   | 15 年   | 16 年   | 17 年   | 18 年   | 19 年   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 検挙件数 | 20,343 | 17,955 | 20,273 | 17,480 | 17,169 |
| 検挙人員 | 14,797 | 12,397 | 13,549 | 11,821 | 12,211 |

#### 検挙人員は年々減ってきています

(出典:警察庁、厚生労働省、海上保安庁)

### 覚せい剤<sup>かくせいざい</sup>以外の薬物事犯検挙人員(人)

| 平成      | 15 年  | 16 年  | 17 年  | 18 年  | 19 年  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 麻薬・向精神薬 | 530   | 635   | 606   | 611   | 524   |
| あへん     | 55    | 68    | 13    | 27    | 47    |
| 大麻      | 2,173 | 2,312 | 2,063 | 2,423 | 2,375 |

(出典:警察庁、厚生労働省、海上保安庁)

## 第5章 麻薬犯罪の現状と取組み

### 少年の覚醒剤事犯の検挙人員

平成15年(2003年)の覚醒剤乱用少年のうち、中・高校生<sup>かくせいざい</sup>の検挙人員は合計52人であり、前年<sup>くら</sup>に比べ58人減っています。

| 平成        | 15 年 | 16 年 | 17 年 | 18 年 | 19 年 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 総数        | 528  | 395  | 435  | 296  | 308  |
| うち<br>中学生 | 16   | 7    | 23   | 11   | 4    |
| うち<br>高校生 | 36   | 41   | 55   | 44   | 28   |

(出典:警察庁、厚生労働省、海上保安庁)

### 少年の大麻事犯の検挙人員(人)

| 平成        | 15 年 | 16 年 | 17 年 | 18 年 | 19 年 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 総数        | 191  | 223  | 182  | 197  | 184  |
| うち<br>中学生 | 3    | 6    | 5    | 4    | 1    |
| うち<br>高校生 | 38   | 38   | 43   | 27   | 28   |

(出典:警察庁、厚生労働省、海上保安庁調べ)



## かくせいざい 覚醒剤・大麻の入手可能性

かくせいざい  
覚醒剤と大麻を手に入れるのはやさしいか、難しいかの調査をしています。かくせいざい  
覚醒剤も、かんたん  
大麻も、簡単に手に入るまたはしょうしょう  
少々苦勞するが何とか手に入る、が 12% 台にもなっています。

| 平成 年                        | かくせいざい<br>覚醒剤 |      | 大 麻  |      |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|
|                             | 11 年          | 15 年 | 11 年 | 15 年 |
| 簡単に手に入る                     | 2.9           | 2.4  | 2.4  | 2.4  |
| 少々苦勞するが何とか手に入る              | 9.8           | 9.8  | 10.1 | 10.3 |
| ほとんど不可能                     | 24.2          | 22.4 | 24.7 | 22.8 |
| ぜったい<br>絶対不可能               | 55.4          | 60.4 | 53.9 | 59.3 |
| かくせいざい<br>覚醒剤という言葉<br>を知らない | 1.8           | —    | 2.9  | —    |
| むかいとう<br>無回答                | 5.9           | 5    | 6    | 5.2  |

出典：厚生労働省「薬物使用に関する全国住民調査」

これらの数字を見ると、薬物乱用防止教室の開催  
やがいとうほどう  
街頭補導活動のきょうか  
強化といった取り組みがある程度ていど  
の成果を上げているものと認められていますが、少年

## 薬物乱用に対する学生の考え方

(%)

| 男<br>女                      | 小学6年生 |      |      | 中学3年生 |      |      | 高校3年生 |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
|                             | H9    | 12   | 18   | H9    | 12   | 18   | H9    | 12   | 18   |
| 絶対に使うべきではないし、許されることではない     |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 男                           | 89.5  | 89.2 | 91.9 | 77.9  | 82.5 | 87.6 | 68.6  | 74.5 | 81.7 |
| 女                           | 92.4  | 91.9 | 95.3 | 85.0  | 85.9 | 91.2 | 81.4  | 87.2 | 91.1 |
| 1回位なら心や体への害がないので使ってもかまわない   |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 男                           | 1.7   | 0.8  | 0.8  | 3.1   | 1.1  | 1.1  | 4.5   | 1.2  | 1.6  |
| 女                           | 1.1   | 0.6  | 0.4  | 2.0   | 0.9  | 0.6  | 2.8   | 0.6  | 0.5  |
| 他人に迷惑をかけないので使うかどうかは個人の自由である |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 男                           | 3.6   | 4.1  | 3.3  | 11.0  | 9.2  | 5/8  | 15.7  | 13.0 | 7.4  |
| 女                           | 2.5   | 3.4  | 2.1  | 6.8   | 7.9  | 4.5  | 8.6   | 7.0  | 3.3  |
| その他                         |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 男                           | 4.5   | 4.2  | 4.7  | 6.6   | 6.3  | 6.2  | 9.5   | 10.6 | 9.3  |
| 女                           | 3.6   | 3.0  | 3.2  | 4.8   | 4.9  | 4.1  | 6.0   | 4.8  | 4.4  |

(出典:文部科学省「薬物に対する意識等調査報告書」)

**小学6年生では、****男女とも、使ってもかまわない、迷惑かけないの****で自由……が、25人に一人いる計算になります**



~~~~~  
の麻薬事件の検挙は高校生を主体に依然^{いぜん}としてあり、大変心配すべき状態が続いています。

「第三次^{せんりゃく}薬物乱用防止五か年戦略」の 取り組み

このような中で、2008年8月、新しく現在の「第三次薬物乱用防止五か年戦略」ができました。また、これを受けて、2010年7月には「薬物乱用防止戦略加速化プラン」が作られました。その項目は次の通りです。

①青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上…（方法）薬物乱用防止に資する教育・予防啓発の一層の充実・強化を図る

②薬物依存・中毒者の治療・社会復帰の支援及びその家族への支援の充実強化による再乱用防止の推進…（方法）再乱用防止対策の取組及び薬物依存からの離脱にかかる対策を強化する。

③薬物密売組織の壊滅及び麻薬乱用者に対する取締りの徹底…（方法）薬物事犯の取締りの徹底を図り、関係機関相互の連携の強化に努める

④薬物密輸阻止に向けた水際対策の徹底、国際的な連携・協力の推進…（方法）国際的な連携・協力の強化を図るとともに、水際対策を徹底する。

3 きっかけと注意すること

青少年の身辺に麻薬が忍び寄っているといわれますがそのきっかけは何でしょうか、どのように注意をしたらよいのでしょうか。例をあげて紹介します。

麻薬を使うようになったきっかけは？

Aさん 僕は、両親、特に母に自分の気持ちをストレートに表現できないでいました。自分の感情を押さえ込んで、いつも「いい子」を演じていました。それが積み積み重ねてクスリを使うようになってしまったのです。クスリを使わないと、自分を表現できないのです。楽しいこと





も、つらいことも素直に表に出せないのです。

これがクスリを使うこととなった始まりです。

Bさん 僕は、人に頼まれれば無理だと思ってもノーと言えなくて引き受けてしまいます。自分の生きづらさのひとつであるイエスマン（人に嫌われたくない病）になってしまうのです。そこから生まれ出る気分の悪さを解消するために麻薬（薬物）やアルコールを使うようになったのです。

Cさん 私は中三のときにいじめに遭いました。クラスの人たちから無視され、陰でコソコソいろんなことを言われていました。もし麻薬（クスリ）を使うことを断ったら、また仲間はずれにされてしまう。その恐ろしさや疎外感の方が私にとっては麻薬を使うことより怖いものだったのです。

麻薬を使い続けるとどうなりますか？

Aさん 覚醒剤をやめたいと思い始めたのは19才のときで、使うメリットよりもデメリットの方が大きくなり始めたからです。デメリットというのは、例えば幻聴です。ある日、通学電車の中で、突然、乗客の声が聞こえ始めたのです。「お前はクスリを使

第5章 麻薬犯罪の現状と取組み ~~~~~

っているから、汚^{きたな}い。電車から降りてくれ。」

それをまともに信じて、電車から降りてしまいました。でも怖^{こわ}くて外に出られませんでした。駅のトイレで夜中までガタガタ震^{ふる}えておりました。最後は駅員に見つかりたたき出されました。駅を出ても、まだ誰かに追^おいかけているというような妄想^{もうそう}から逃げられず、幻聴^{げんちょう}にも悩^{なや}まされました。

比叡山^{ひえいざん}へ行き一晩明^{ひとばん あ}かしましたが、それでも幻聴^{もうそう}や妄想^きは消えず、どこかから覗^{のぞ}かれているのではない、盗聴^{とうちょう}され

ているのではないか……。もう、幻聴と妄想の世界です。そうになるともう眠^{ねむ}れません。ご飯も食

べられません。こんなに苦しい思いをするくらいなら、もうクスリはやめよう。そう考えてクスリをやめるのですが、2～3ヶ月でまたクスリを使い始めるのです。





~~~~~

**Bさん** 人から頼たのまれれば断ことわれない、自分を自分で追おい込んでしまいます。イエスマンから生まれ出る気分の悪さを解かいしょう消するためにクスリやアルコールを使うことになり、そのたびにコントロールが効きかなくなりました。クスリがなくてはいられなくなりました。「このままではボロボロになる。またあの苦しみを味わいたくない。」という気持ちと「どうにでもなれ。」という気持ちとの戦たたかいです。

この戦いから、抜け出すことはなかなか難むずかしいことです。一人では出来ません。

**Cさん** 中学3年生から高校卒業するまで、ほぼ毎日のようにクスリを使っていました。卒業したらクスリは止めるといいながら、やめられませんでした。周まわりの人達には、「もうしっかりやる。クスリは絶ぜったい対にやらない、やめてちゃんとする。」などと言いながら、隠かくれて一人で使うようになっていきました。1年くらい経たつと、周りには誰もいなくなり、家の中に一人ぼっちになってしまったのです。1ヵ月後自分の家に火をつけました。そして、母のいる東京に来ました。東京に来て半年ほど仕事をしてい

## 第5章 麻薬犯罪の現状と取組み ～～～～～～～～～

ましたが、またクスリを使うようになりました。母の紹介で精神科へ通院つういんしましたが、1年半位後に覚醒剤取締法違反かくせいざい いはん たいほで逮捕されました。その後も精神科に通院しましたが、クスリが止まらず、今の「東京ダルク」に入寮にゅうりょうしました。

### 大切なこと

今の世の中は、身の回りみ まわの近くで、思いもかけないようないろいろなことが起こります。地震・台風・豪雨ごううや交通事故などです。

このような状況ですと、誰もが心の痛みや体の痛みを持っていることが不思議ではありません。このような痛みを抱えて生きていくことは容易よういなことではありません。その痛みを努力なしで効率的こうりつてきに、しかも簡単かんたんに取ってくれるのが魔法まほうのクスリ、“麻薬”です。だから、麻薬がなくてはいられなくなることでもでてくるのです。

自分は、意志が強いし、一度くらいクスリを使っても大丈夫だ、と思う人が多いのです。ところが、一度試ためしてみると、今度はやめることが非常に難むずかし



くなるのです。これを「麻薬（薬物）依存症」といいます。今は、「依存症」は病気の種類とされています。病気ですから、一人で治すことはなかなか難（むずか）しいのです。まず、大切なのは、自分から「薬物依存症から抜け出したい」と思うことが大切です。その上で保健所とか、精神科医とか、ダルク（DARC）などの力を借りることが肝心（かんじん）と思います。が、何よりも大切なことは、麻薬などの薬物の力を借りることのないように一人々々が努力することなのです。



税関は、不正薬物をはじめとする、社会の安全・安心を脅かす物品を、全国の港や空港などの水際で、24時間取り締まっています。



密輸ダイヤル(24h)  
税関ホームページ

0120-461-961  
<http://www.customs.go.jp/>

## 財務省の密輸阻止の ポスター

## 通 関 業 者 も 協 力

麻薬・覚醒剤絶滅<sup>かくせいざいぜつめつ</sup>を掲<sup>かか</sup>げていろいろなところで活動が行われています。

麻薬はほとんどが密輸入品といわれています。輸入貨物に隠したり、郵便物に隠したり、入国する旅客の携帯品に隠したりして密輸入されるのです。

輸出入通関手続<sup>だいきこう</sup>のほとんどを代行している通関業者で構成される(社)日本通関業連合会などでは、関税局・税関との間で 1992 年以來「密輸防止に関する<sup>おぼえがき</sup>覚書」(約束)にのっとり密輸防止に協力しています。



ぼくめつ  
((社)日本通関業連合会の「密輸撲滅キャンペーン」  
2005 年 5 月 東京・新橋駅前で)